NÁVOD PRO VÝSADBU A PĚSTOVÁNÍ HUB NA ZAHRÁDCE

Vhodné pro: směs lesních hub, Pýchavku, Hlívu ústřičnou

Období: jaro, léto, podzim

Obsah balení: Balení obsahuje obilí naočkované myceliem dané houby.

Výběr stanoviště:

Před samotnou výsadbou je nejdůležitější správný výběr stanoviště. Všechny zmíněné houby mají totožné či podobné nároky. Houby nemají rády příliš velkou intenzitu slunečního záření, a proto je ideální pro výsev zastíněné místo ze západní strany.

Obecně se doporučuje houby vysadit co nejblíže stromu (dub, buk, bříza, habr, smrk, borovice, tůje). Nemusíte se obávat o degeneraci stromu, podhoubí je v symbiotickém vztahu s jeho kořeny. Pýchavka nepotřebuje ke svému životu strom či keř, může se vysadit na kterékoliv místo zahradního trávníku, popř. k plotu, kde je hojně kopřiv.

Půda:

Houbám se daří v mírně kyselých rašeliništních půdách s vyšším obsahem přírodních dusičnanů. Přírodním indikátorem pro takovouto půdu je výskyt kopřiv.

Doba sadby:

Pro výsev je vhodné období od dubna do listopadu. Vysévat se může i mimo toto období, ale je nutné dbát na to, aby nebyla půda promrzlá. Pokud se podhoubí důsledkem poklesu teplot pod bod mrazu neuchytí, nelze s úrodou počítat.

Sadba:

Vlastní sázení probíhá tak, že rýčem vyryjeme drn porostu (co nejblíže, nejlépe na úpatí vybraného stromu/pařezu) o síle asi 3 cm a o rozměrech 30 x 30 cm tak, aby byly obnaženy kořeny podrostu (trávníku). Obilí napuštěné myceliem hub opatrně vyjměme z obalu a rukou rozmělníme do vniklé jamky (používáme gumové rukavice). Vyrytý drn okamžitě vrátíme na původní místo a mírně přišlápneme. Tato operace musí probíhat co nejrychleji, aby nedošlo k oschnutí narušených kořenů a aby po návratu vyrytého drnu na původní místo byla zaručena jejich životaschopnost.

Zálivka a hnojení:

Do místa osázeného sadbou je dobré nahrabat starší rozpadlý kompost nebo chlévskou mrvu a pokropit odraženou vodou. Přihnojování je vhodné jen jedenkrát za rok a pouze za deštivého období či v zimě, kdy je podhoubí v klidu.

Umělá hnojiva nepoužívat, došlo by ke zničení podhoubí!

Zálivku je potřeba provádět každý den po dobu 14 dní, nebo do příchodu dešťových přeháněk.

Růst a sklizeň:

Houbové mycelium se po měsíci začne samovolně rozrůstat do okolí (obalovat kořeny stromu). První plodnice můžeme očekávat v tentýž rok výsadby (léto – začátek podzimu), ale také až za 2 roky. Nasazení plodnic nelze nijak ovlivnit. Stejně jako v přírodě, jeden rok je všude hub hojně a druhý rok prostě neporostou. První sklizeň přijde v závislosti na podmínkách a rychlosti, jakou se podhoubí rozroste. Pokud pěstujeme směs lesních hub, objeví se vždy plodnice pouze jednoho druhu.

Skladování výsadby:

Sadbu je vhodné skladovat v temném místě při teplotách do 6 °C. Při těchto teplotách vydrží 2 - 4 měsíce.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při pěstování a velikou úrodu. Jen nepropadejte skepsi, když Vám sadba nezačne plodit již první rok výsadby. Jedná se o houby, které si musí vytvořit podhoubí, což někdy trvá. Plodnice se objeví v okamžik, kdy je nejméně očekáváte.